



Утренний туалет тяжелобольного: туалет ушей

- Цель. Показания. Возможные проблемы. Оснащение.
- Поздороваться. Представиться. Идентифицировать пациента. Оценить возможность пациента участвовать в процедуре. Рассказать цель и ход манипуляции. Получить согласие.
- Вымыть и осушить руки.
- Подготовить необходимое оснащение.
- Помочь пациенту занять удобное положение. Прикрыть его шею и плечо полотенцем.
- Надеть перчатки.
- Попросить его наклонить голову в сторону, противоположную обработке.
- Набрать в пипетку 3% раствор перекиси водорода, оттянуть левой рукой ушную раковину назад и вверх. Правой рукой закапать в наружный слуховой проход 2-3 капли. Оставить пациента в таком положении 1-2 минуты.
- Ввести в слуховой проход вращательными движениями сухую турунду, оттянув при этом ушную раковину назад и вверх. Вывести турунду обратно. Повторить процедуру несколько раз, меняя турунды.
- Поместить в лоток использованные турунды для проведения последующей дезинфекции и утилизации.

- Обработать влажным тампоном, смоченным в теплой воде, ушную раковину, затем тщательно просушить ее сухими ватными тампонами.
- Обработать другое ухо подобным образом.
- Помочь пациенту занять положение, удобное для пребывания в постели. Убедиться, что он чувствует себя комфортно.
- Подвергнуть дезинфекции использованные предметы ухода и материал.
- Снять перчатки и утилизировать.
- Вымыть и осушить руки.
- Сделать запись о выполнении процедуры и реакции пациента в документации.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?