



## Внутримышечная инъекция

- «Здравствуйте!» «Я процедурная медсестра» «Меня зовут (ФИО)»
- «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?»
- «Пациент идентифицирован в соответствии с листом назначений»
- «По назначению врача я введу лекарственный препарат \_\_\_\_\_ (указать наименование в соответствии с условием) внутримышечно (верхний наружный квадрант ягодицы) для уменьшения болевых ощущений.
- Процедура проводится в положении лежа на животе на кушетке. В течение процедуры прошу Вас не шевелиться и сообщать мне о любых изменениях Вашего состояния». «Пациент не отмечает аллергию на данное лекарственное средство»
- «Вы согласны на проведение данной процедуры?» «У пациента нет возражений на проведение данной процедуры»
- «Займите удобное положение на кушетке лежа на животе или я могу вам в этом помочь»
- «Герметичность упаковки одноразового шприца не нарушена. Визуальная целостность упаковки одноразового шприца сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»
- «Герметичность упаковки иглы для инъекций не нарушена. Визуальная целостность упаковки сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»

- «Герметичность упаковки одноразовых спиртовых салфеток не нарушена. Визуальная целостность упаковки сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»
  
- Сверить упаковку с лекарственным препаратом с назначением врача «Наименование, дозировка, объем, процентная концентрация лекарственного препарата соответствует листу назначений»
  
- Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты
  
- Надеть средства защиты (маску)
  
- «Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»»
  
- Надеть нестерильные перчатки
  
- Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе
  
- Достать ампулу из упаковки. «Название лекарственного препарата, объем, процентная концентрация и дозировка соответствуют листу назначений»
  
- Взять ампулу с лекарственным препаратом в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому

- Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части
- Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой
- Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы
- Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя "
- Вскрытую ампулу с лекарственным препаратом поставить на манипуляционный стол
- Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
- Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня
- Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)
- Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю
- Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
- Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, переворачивая ампулу вверх широкой частью, чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр шприца
- Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»

- Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца
- Поместить иглу в контейнер для сбора острого инструментария класса «Б»
- Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца
- Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы
- Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
- Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы
- Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку
- «Освободите от одежды ягодичную область для инъекции или я могу вам в этом помочь»
- Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции
- Обработать место инъекции 2-ей спиртовой салфеткой
- Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
- Обработать место инъекции 3-ей спиртовой салфеткой

- Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
- Использованные упаковки от салфеток поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
- Взять 4-ую салфетку с антисептиком и положить её под мизинец не доминантной руки
- Взять шприц и снять колпачок с иглы. Колпачок от иглы утилизировать в отходы класса «А». Шприц в доминантную руку взять таким образом, чтобы мизинец был на канюли иглы, все остальные пальцы на цилиндре шприца.
- Не доминантной рукой в месте инъекции растянуть кожу большим и указательным пальцами.
- Быстрым движением ввести иглу под углом 90° на 2/3 её длины
- Перенести не доминантную руку на поршень шприца. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови в конюле иглы. «Кровь в канюле иглы отсутствует»
- Нажимая большим пальцем на поршень, медленно ввести лекарственный препарат.
- Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата
- Поместить иглу от шприца в ёмкость для сбора острых отходов класса «Б»
- Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских

отходов класса «Б»

- «Наружного кровотечения в области инъекции отсутствует»
- «Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя удовлетворительно»
- Поместить салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»
- Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
- «Обрабатываю рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками методом протирания двукратно с интервалом 15 минут (если иное не предусмотрено инструкцией производителя дезинфицирующего средства)»
- «Салфетки помещаем в емкость для медицинских отходов класса «Б»
- Снять перчатки
- Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»
- Снять маску
- Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»
- Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»
- Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской

## документации

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?